

FOTO – HERBÁŘ 2005

Zuzana Kociánová

4. B

Dobromysl obecná (*Origanum vulgare*)

čeleď: hluchavkovité

místo: Kopřivnice

lokality: okraj lesa, křoviny

datum: 14. 7. 2005

- byliny vytrvalé až přes půl metru vysoké

výskyt: na výslunných stráních, v křovinách, na pasekách a při okraji lesů, hlavně v teplejších oblastech

význam: diuretikum, expektorans, k tlumení hysterie, na kloktání a koupele



Dobromysl obecná (*Origanum vulgare*) *pokračování*

stonek: lodyhy zpravidla přímé, listnaté

listy: krátce řapíkaté, podlouhle vejčité, téměř celokrajné, žláznatě tečkované, prosvítavé, často fialově naběhlé

květenství: chocholičnatá lata, květy světle nachové, zřídka bělavé

doba květu: červenec - září

plody: hnědé tvrdky



Mák vlčí (*Papaver rhoeas*)

čeleď: mákovité

místo: Kopřivnice

lokalita: pole

datum: 15. 7. 2005

- jednoletá bylina s přímou, odstále štětinkatou, listnatou, téměř 1 m vysokou lodyhou

výskyt: jako plevel v polích, na rumišťích a mezích od nížin do podhůří v teplejších oblastech

využití: antibechikum, protektivum, přísada do čaje proti kašli, v kombinaci s dalšími ingrediencemi občas slouží jako sedativum



Mák vlčí (*Papaver rhoeas*) pokračování

stonek: lodyha

listy: zpeřené, úkrojky hluboce laločnatě zubaté, spodní řapíkaté, horní až přisedlé, štětinkaté

květenství: květy jednotlivé na dlouhých, odstále štětinkatých stopkách

doba květu: květen - červenec

plody: makovice obvejčité, lysé



Štětka lesní (*Dipsacus sylvestris*)

čeleď: štětkovité

místo: Lubina

lokality: rumišťe u cesty

datum: 20. 7. 2005

- dvouletá statná, až přes 150 cm vysoká bylina

výskyt: na náplavech, pastvinách, rumišťích a podél cest v nižších polohách

využití: suché strboulky se užívají k dekoraci, odvar jako diuretikum, diaforetikum, depurativum při ekzémeh a akné



Štětka lesní (*Dipsacus sylvestris*)

pokračování

stonek: lodyhy přímé, na hranách osténkaté

listy: lodyžní podlouhle kopinaté, vstřícné, spodinou párovitě srostlé, na okraji a středním žeburu osténkaté, přizemní listy v růžici

květenství: stopky strboulů hustě oslnité, květy bledě fialové, zřídka bělavé, zákrovní listenny většinou delší než strboul, květní listeny šídlovitě osténkaté, delší než květy

doba květu: červenec - srpen

